

Hvad skal jeg vide om Rivaroxaban

- ◆ Rivaroxaban gør blodet tyndere, hvilket forhindrer dannelse af farlige blodpropper.
- ◆ Rivaroxaban skal tages nøjagtigt, som lægen har ordineret. For at få optimal beskyttelse mod blodpropper må du **aldrig springe en dosis over**.
- ◆ Du må ikke holde op med at give/tage Rivaroxaban uden først at have talt med lægen, da risikoen for blodpropper kan stige.

- ◆ Informér sundhedspersonalet om evt. Anden medicin, barnet/du tager nu, har taget for nylig, eller har til hensigt at begynde at tage, inden barnet/du begynder at tage Rivaroxaban.

- ◆ Informér sundhedspersonalet om, at barnet/du tager Rivaroxaban, inden operation eller andre indgreb.

Hvornår skal jeg søge råd hos lægen?

- ◆ Når du tager blodfortyndende medicin som Rivaroxaban, er det vigtigt at kende mulige Bivirkninger. Blødning er den mest almindelige bivirkning.

Start ikke med at give Rivaroxaban til barnet/tage Rivaroxaban, hvis du ved, at barnet/du har risiko for blødninger, uden først at have talt med lægen om det. Fortæl det straks til lægen, hvis barnet/du får tegn på blødning som f.eks.:

- ◆ smerter
- ◆ hævelse eller ubehag
- ◆ hovedpine, svimmelhed eller svaghed
- ◆ usædvanligt mange blå mærker, næseblod, blødning fra tandkødet, sår, hvor blødningen er lang til om at stoppe
- ◆ menstruation eller vaginalblødning, som er kraftigere end normalt.

- ◆ blod i urinen, der kan være rosa- eller brunfarvet, rød eller sort afføring
- ◆ ophostning af blod eller opkastning af blod eller noget, der ligner kaffegrums.

Dr.Reddy's  Patientkort
Rivaroxaban Reddy

Oplysning til omsorgspersoner/patienter:
◆ Hav altid dette kort på dig
◆ Vis altid kortet til læge eller tandlæge før behandling af patienten.

Patienten som er under antikoagulationsbehandling med Rivaroxaban

_____	_____
Navn:	Anden medicin/andre forhold:
_____	_____
Adresse:	_____
_____	_____
_____	_____
Fødselsdato:	Vægt:
_____	_____
_____	_____

I akutte situationer, kontakt venligst:

Lægens navn:

Lægens telefonnummer:

Lægens stempel:

Kontakt venligst også:

Navn:

Telefonnummer:

Relation:

Information til sundhedspersonale:

- ◆ INR-test bør ikke anvendes, da det ikke er et pålideligt mål for Rivaroxabans antikoagulerende aktivitet